

四庫全書

子部

欽定四庫全書

普濟方卷三百三十五 明 周王朱橚 撰

婦人諸疾門

血氣心腹疼痛

附論

夫婦人血氣心痛者由臟腑虛血氣不調風冷邪氣乘於心也其痛發有死者有不死者成疹者心為諸臟之主而主於神其正經不可傷傷之痛者故痛發乍輕乍甚而成疹者也○心腹痛者服菩薩湯妊娠心腹忽痛

若不急治則痛擊胞絡必致胎動與人參湯二氣丸若因產而心腹內痛者緣氣血俱虛臟腑未實飲冷食生寒氣與熱氣相感是以為痛不治則變痢菩薩湯加紅花主之

方

治婦人心痛脾疼

用荔枝核灰存性為末淡醋湯下亦治男子小兒卒心痛蚌粉湯下

沒藥散 治婦人血氣壅滯攻心疼痛

沒藥

半兩

當歸

判微炒

赤芍藥

牡丹皮

桂心

檳榔

川大黃

判微炒

牛膝

去苗已上各一兩

右為細散每服食前熱酒調下一錢

地黃散 治婦人血氣刺心腹痛脇防悶不欲飲食

熟乾地黃

當歸

判微炒

木香

乾膝

搗碎炒令烟出

白朮

桂心

枳殼

麩炒微黃去穰

檳榔

已上各三分

右為細散每服食前以醋調下一錢

烏藥散

治婦人血氣攻心痛發歇不定

烏藥

莪茂

桂心

當歸

炒

桃仁

青皮

木香

右等分為末每服二錢熱酒調下

當歸散

治婦人血氣刺心痛面無顏色四肢不和

當歸

剉微炒

檳榔

桂心

蓬莪茂

白朮

各三分

吳茱萸

半兩湯浸七遍焙乾微炒

右為散每服三錢水一盞生薑半分煎至八分去滓

不計時候稍熱服

木香散

出聖惠方

治婦人血氣心痛及蛇蟲疰心痛並主之

木香

赤芍藥

各一兩

鶴虱

一兩半

當歸

二兩剉微炒

檳榔

一兩

伏龍肝

半兩

右為細散每服食前熱酒調下一錢

九痛丸

出危氏方

治九種心痛一蟲二疰三風四悸五食六

飲七冷八熱九瘧去來此悉治之又治連年積冷流

疰心胸疼痛并療冷氣衝上落馬墮車瘀血等疾

狼毒

兩

乾薑

人參

各一兩

附子

炮去皮用三兩

茱萸

炒一兩

巴豆

去皮心膜炒乾取一兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服一丸空心溫酒

下卒中惡心腹脹痛口乾不能言者服二丸立安

當歸散

出聖惠方

治婦人血氣攻心疼痛及一切積冷氣痛

當歸

三分剉微炒

吳茱萸

一分湯浸七遍焙微炒

桂心

三分

右為細散每服食前以生薑熟酒調下一錢

雞活香散

治男子婦人九種心痛一切冷氣

良薑

判細麻油炒

桂心

赤芍藥

等分

右為末每服二錢水一盞入鹽木瓜三片同煎七分  
溫服鹽湯點亦可血氣疝瘕痛用熱醋湯調下忌生  
冷應痛散同不用桂心用醋煎醋湯點亦可

牡丹丸

出永類  
鈴方

治婦人脾血積氣及心脾疼

方見本門血氣  
心腹疼痛類

菖蒲丸

出永類  
鈴方

治婦人脾血積氣及心脾疼

菖蒲

九節者  
六兩

吳茱萸

炮

香附子

炒去毛  
各四兩

右並判細以釀醋五升煮乾為度焙乾為末以好神



麴打糊為丸如梧桐子大每服空心食前以淡薑湯吞下四五十丸日三橘皮湯亦好

黑金散 治婦人血氣心疼

香附子

半斤

高良薑

五兩

五靈脂

三兩

右將香附子良薑以醋煮乾用灰炒為末酒下

治婦人血氣衝心欲死者

芫花

三錢

吳茱萸

五兩

右為末炒薑酒下

丁香湯 治婦人卒心痛

用室女頭髮一塊如雞子大燒灰入丁香七箇同研細熱酒調下半錢

治婦人久冷血氣攻心疼痛不止

出聖惠方

吳茱萸

三兩湯浸  
兩桃仁  
去皮尖

右藥漫火同炒令熟即揀出茱萸不計時候熱酒嚼

下桃仁五枚

靈苑花 治婦人卒血氣心痛

用生五靈脂為細末每服一錢沸溫服

治血塊橫心叫噉其痛欲絕至危者如喫不得可灌下  
用其大順散三錢熱酒調服立止

治血刺心痛婦人之疾

用玄胡索不以多少新瓦炒微黃不可焦礪為細末  
每服三錢酒一盞煎至七分服不能飲者陳米飲調  
下不拘時候以酒調亦得二者不若酒煎快此藥屢  
驗王執中既效方玄胡索鹽炒乾蝎半之醋湯下

紫金散 治婦人血氣刺心痛

用紫金藤一兩米泔浸一宿焙乾為末每服二錢用鐵秤鎚燒紅淬溫酒下

治婦人血氣刺心痛不可忍

用木香末酒服之不拘多少一方用青木香

治婦人宿血氣心痛冷氣結聚用鬱金溫醋磨服之

治婦人氣血心痛破瘀癖冷氣

方見本門  
瘀癖類

又方

出聖  
惠方

治婦人久冷血氣攻心疼痛不止

用取豉一團如雞子大以青布裹繫定剪却剝燒令煙盡勿使灰搗羅為散不計時候以熱酒調下二錢

治暴心痛

用古鑑鼻燒酒淬服之

治婦人急心疼

出危此方

用南康真蛤粉為末細炒赤以酒調熱服愈

阿魏丸

出聖惠方

治婦人血氣攻心疼痛及一切積冷氣

當歸

炒

桂心

青皮

附子

炮

白朮

阿魏

麝裏煨麝熟為度

川芎

各一兩

吳茱萸

炮

乾薑

各三分

檳榔

肉豆蔻

煨

延胡索

莪茂

各一兩

硃砂

細研半兩

右為末先以醋一升煎阿魏成膏和藥末搗三五百杵丸如梧桐子大服二十丸食前溫酒下

腹內冷痛

用茅香煮服之

換金丸

出百選方

治婦人諸虛不足心腹疼痛

當歸 沒藥 玄胡索 川芎 藁本 人參

白茯苓 牡丹皮 甘草 白芍藥 熟地黄

白朮 白芷 白薇 各等分產實方有桂心却無地黄

右為細末煉蜜和丸如彈子大服一九酒送下

琥珀散

出聖惠方

治婦人血氣上攻心腹疼痛經絡不利黃

瘦虛羸

琥珀

細研

麒麟竭

木香

沒藥

桂心

芸薹子

吳茱萸

湯浸七遍焙乾微炒各半兩

延胡索

當歸

剉微炒

牡丹

各一兩

麝香

一錢細末

青橘皮

半兩湯浸去白穰焙

右為末細散入麝香研勻每於食前熱酒調下二錢

大延胡索散

出危氏方

治婦人經病并產後腹痛或腹滿喘

悶或癥瘕痞塊及一切心腹暴痛

延胡索 當歸 赤芍藥 京三稜 川練子

蓬莪茂 官桂 厚朴 木香 川芎

各一分

桔梗 黃芩 大黃

各半兩

甘草 檳榔

二錢

右為末每服三錢水一鍾煎至六分去滓熱服食前日三服惡物過多去大黃官桂加入黃藥子朶子龍



骨各半兩如前法平人心胃急痛如本方煎服得利尤良一方無川芎

異功散

出永類  
鈴方

治婦人血冷氣痛心胸煩悶不思飲食

四肢無力頭暈昏疼寒熱往來狀似勞倦並皆治之

牡丹

芍藥

白芷

乾薑

各三錢

當歸

玄胡索

陳皮

去白

官桂

烏藥

川芎

苦梗

各半兩

右生為末每服二錢生薑三片酒水各半盞煎至七分溫服初生產時宜服此藥每日三服七日後漸減

服數至一月滿永無疾病服藥後些少腹痛不妨幸  
勿嘈噴

沈香活丸 治血氣不調臟腑積冷臍腹疼痛肌體日  
瘦

沉香 廣茂 訶子 去皮各一兩 肉豆蔻 丁香

良薑 各一兩 麝香 一分 椒紅 當歸 白朮

附子 炮去皮各一兩

右為末麝香和勻酒糊為丸如梧桐子大每服三十

丸溫酒下

沒藥散

出危氏方

治一切血氣臍腹撮痛及產後惡露不行

見枕塊痛宜服

血竭 沒藥 桂心 當歸 蒲黃 紅花

木香 延胡索 乾漆 赤芍藥

各等分

右等分為細末每服二錢熱酒調下食前若血塊衝

心痛甚危者以大順散三錢熱酒調服立止

五經湯

出百選方

治婦人諸虛不足心腹疼痛

熟乾地黄

半兩

人參

桂心

半夏

湯洗七遍

白芍藥

阿膠

麥門冬

各二錢半

吳茱萸

湯浸七次

牡丹皮

當歸

各二錢半

右為末每服三錢水一盞生薑五片煎至七分溫一

方有川芎甘草無熟乾地黄

海藏當歸丸

出濟生拔萃方

治三陰受邪心臍少三腹疼痛氣

風等證

四物湯

各半兩

防風

獨活

全蝎

各半兩

續斷

一兩

苦楝

玄胡

各七錢

木香

丁香

茴香

一兩炒

右為細末酒糊為丸如梧桐子大空心溫酒下三五  
十九大效

玄胡索湯

出危氏方

治婦人室女七情傷感遂使血與氣併

心腹作痛或連腰脇或引肩背上下攻刺甚作搐搦  
經候不調但是一切血氣疼痛亦可服之

當歸

去蘆頭酒浸剉炒

玄胡索

炒去皮

蒲黃

赤芍藥

官桂

不見火各半兩

片子薑黃

洗

乳香

沒藥

木香

不見火各三錢

甘草

炙二錢半

右咬咀每服四錢水一盞半煎至七分生薑七片去滓食前溫服吐逆加半夏橘紅各半兩

瑞金散 治婦人血氣撮痛月經不行預先嘔吐疼痛及月信不通

片子薑黃

四兩

牡丹皮

莪茂

紅花

當歸

赤芍藥

川芎

桂心

延胡索

右為末每服二錢水一盞酒三分煎七分溫服日三

次

延胡索散 治婦人血氣攻心腹疼痛

延胡索 當歸 川芎 桂心 各三兩 枳殼 木香

赤芍藥 桃仁 各半兩 熟地黄 一兩

右㕮咀每服三錢水一盞薑三片煎至七分去滓熟服

琥珀散 治婦人血氣攻心腹躁煩悶亂疼痛不止及產後惡露不行兇枕塊痛

琥珀 沒藥 當歸<sub>炒</sub> 赤芍藥 牡丹皮 蒲黃

延胡索 莪茂 桂心

<sub>各等分</sub>

右為末每服一錢溫酒調下一方加血竭紅花木香  
乾漆無丹皮琥珀莪茂等分

紫金散 治婦人血氣相搏心腹急痛一切疼痛不可  
忍者

當歸<sub>酒浸</sub> 玄胡索 川芎 肉桂<sub>各半兩</sub> 香附子

烏藥 紫荊皮<sub>各一兩</sub> 木香<sub>煨</sub> 甘草<sub>各一錢</sub>



右為細末每服二錢熱酒點服立效霹靂食下亦得  
治婦人一切血氣疼痛如神烏雞煎

當歸 川芎 附子 茯苓 白朮 赤芍藥

白薑 地黃 官桂

右各一兩為咬咀用烏雞一隻去頭足肚將藥盛雞  
肚內用布袋盛之好酒醋各五升砂瓶煮剩下一盞  
留打糊為丸如梧桐子大每服三十丸溫酒鹽湯送  
下食前

八僊散 治婦人血氣心腹疼痛立驗

當歸 厚朴 芍藥 枳殼製 人參各四兩 甘草

茯苓各五分 肉豆蔻二分

右為末水二升煎取八合空心三服

牡丹散 治婦人久虛羸瘦血塊走疰心腹疼痛不思飲食

牡丹皮 桂心 當歸 延胡索各一兩 莪茂

牛膝 赤芍藥 京三稜一兩半

右為粗末每服三錢水一盞酒半盞煎七分溫服

乳香散 治婦人久冷血氣心腹疼痛

乳香

一分

沒藥

木香

吳茱萸

湯浸七遍焙乾微炒

硃砂

細研各一分

當歸

剉微炒

芳藟

各三分

桂心

兩

右為細散每服食前熱酒調下一錢

木香丸

治婦人血氣心腹疼痛

木香

半兩

肉豆蔻

去殼

川大黃

剉碎微炒

檳榔

乾薑

炮製

蓬莪茂

香墨

各一兩

巴豆

一分去皮心研紙裏壓去油

右為末入巴豆同研令勻醋煮麪糊為丸如菜豆大  
每服於食前以溫酒下五丸粥飲下亦得

神聖北亭丸 治婦人積年血氣攻心刺疼痛不可忍

者及多方醫療不瘥急宜服此大有奇效又名靈苑  
丸

北亭焙去石沒藥 木香 當歸各一分 芫花

蓬莪茂各半 巴豆去皮心膜四十粒

右先研北亭沒藥巴豆如粉用好醋三升同煎如稀

膏然後將餘四味為細末入於膏內搏合成塊用新  
瓦合盛之臨時加減丸數用酒醋各半盞煎數沸通  
口服不得嚼破仍須喫盡酒醋立瘥或男血氣亦依  
前方服食如急喉閉者男左女右以一九鼻中嗅之  
立愈原方云臨時加減丸

丸未分大小服法又無數目

古人亦鹵莽也既有北亭羌花巴豆合當丸如茶豆  
大每服只五丸

沒藥丸 治婦人血氣攻心腹疼痛經脉不調口乾燥

沒藥

半兩

木香

檳榔

蓬莪茂

硃砂

細研

當歸

剉微炒各一兩

朱砂

半兩細研

右為末用米醋熬硃砂成膏和丸如菉豆大不計時

候以熱酒下十丸

沒藥散

治婦人血氣不利攻心腹疼痛

沒藥

當歸

剉微炒

琥珀

桂心

各一兩

木香

半兩

芍藥

三分麝香

一分細研

右為細散入麝香同研令勻每服熱酒調下二錢日

三四服

內炙丹 治臟腑久冷中焦停寒心腹臍下疼痛肢節  
倦怠心悸怔忡食少惡心

萆撥 桂心 乾薑 炮用 舶上硫黃 細研

金釵石斛 細剉酒浸各半兩 附子 炮去皮臍 澤蘭葉 各一兩

右為細末麪糊為丸如梧桐子大煨過朱砂為衣每  
服三十丸至五十丸煎艾葉鹽湯空心下

蓬莪茂丸 治婦人久積血氣風冷經候不調心腹疼痛

蓬莪茂

一兩

牛膝

去苗

沒藥

當歸

剉微炒

木香

桂心

各三分

硃砂

一兩別研

右為末用醪醋煎硃砂成膏入藥末和丸如梧桐子大每服食前以熱酒下十九

紅花丸

治腹中血氣刺痛月事不通

用紅花子一升為末以好酒一升八合拌了曝乾再為末用蜜和丸如梧桐子大空心酒下四十九一為散每服三錢空心溫酒服



治女子婦人患血氣腹腫痛

用山豆根為末三錢熱酒下空心服之

軟金花九 治胸心腰腹急痛或淋瀝并產前後經病

刺痛血氣勞傷往來寒熱四肢困倦夜多盜汗者兼

治血積食積

當歸半兩 乾漆生 巴豆去殼各二錢 斑蝥生全 輕粉

硃砂 粉霜各一錢

右為末同研細棗肉為膏旋丸如棗豆大每服一丸

新水下病甚者加服看虛實

治婦人血氣刺痛大小腹痛並血脉不調走疰疼痛並  
皆治之

川當歸

白芍藥

各一兩

香附子

半斤炒去毛

山慈姑

二兩

熟地黄

二兩

甘草

一兩

右咬咀每服三錢水一盞烏梅一箇荊芥少許同煎  
七分空心溫服如腹中冷痛不止者加阿膠二片同  
煎立效

蘇沉麝香丸

治諸血氣痛不可忍

血竭

沒藥

沉香

辰砂

各一分

木香

麝香

各半分

右生為末磁器熬生甘草膏丸如皂子大每一丸薑

鹽湯嚼下產後血痛氣痛并主之亦治脾痛

硃砂丸

治婦人血氣攻心腹疼痛宜服此行經脉利

氣血立效

硃砂

水銀

琥珀

朱砂

麝香

硫黃

各一兩

右以硫黃結成砂子都研令極細用酒煎狗膽一枚

為膏和丸如梧桐子大每服溫酒下五丸

加減四物湯 治婦人血氣不足肢體乏力或瘀血腹痛或下血過多

當歸 川芎 芍藥 乾薑

炒各半兩

南木香

甘草

炒各二錢半

右咬咀剉散每服三錢食前煎服若腹不痛則無瘀血更加人參又能益其血也

治婦人血氣撮痛

芸薹子

隔紙炒  
半兩

沒藥

三錢

赤芍藥

當歸

莪茂

各一兩

右為末每服三錢熱酒調下

沉香散 治婦人一切血氣刺痛不可忍者及男子冷

氣痛並治之

沉香 木香 當歸 白茯苓

白芍藥

各一錢

右咬咀每服一錢水三盞於銀石器內不用銅鐵器文武火煎數沸入全陳皮一箇又煎十數沸入好醋一盞又煎十數沸入乳香沒藥如皂角子大一塊同

煎至一盞去滓通口服不拘時候

菩薩湯 治產後胎前心腹痛

木香

不見火  
半兩

桂枝

不見火  
七錢半

當歸

三錢酒  
浸去蘆

赤芍藥

半兩

甘草

二錢  
半

右㕮咀每服三錢水酒各半盞煎七分熟服不拘時

牡丹煎 治婦人血膈

牡丹 苦參 貝母

去心

玄胡索

白芍藥

右等分為末煉蜜丸如梧桐子大每服十五二十九

米飲吞下無時候

烏藥散 治婦人血氣上攻心腹疼痛不可忍神情悶亂

烏藥 木香 桂心 青橘皮

湯浸去白穢焙

蓬莪茂

已上各二兩

右為細末散每服生薑半兩拍碎黑豆半合同炒令豆熟入童子小便一盞煎五七沸瀘去滓調下立止

芸薹子 治婦人血氣痛不可忍

芸薹子 紅花 五靈脂 延胡索

各半兩

三稜

莪茂

各一分

右為末每服二錢熱酒調下

當歸丸

治婦人血氣不和心腹疼痛

當歸

二兩  
微炒

硃砂

一兩  
別研

桂心

沒藥

各一兩

蓬莪茂

二兩

右為末用好酒醋大盞銀器內漫火熬硃砂成膏入

藥末和丸如梧桐子大每日空心及晚食前以醋湯

調下十九

沒藥散

治婦人血氣疼痛不可忍者



紅花 沒藥 當歸 延胡索

炒

右等分為末每服二錢童子小便酒水各半盞同煎至六分熱服只用秤錘淬過調亦可常服只用溫酒調下二錢治月經欲來前後腹中痛

手拈散 治婦人血氣刺痛不可忍者亦治諸般氣痛

草果

煨

玄胡索

炒

五靈脂

揀去沙石炒各一兩

沒藥

五錢

右為末酒調三二錢服

治婦人血氣腹痛經候或多或少

蔓荊子

香附子

懷香子

晚蠶沙

各等分

右咬咀炒焦酒淬去滓服未愈再服即愈

菖蒲散

治婦人血氣痛

石菖蒲

良薑

桂心

各一兩

香附子

二兩

右為末熟湯調下二錢

治婦人血氣腹內滿

以草蒿秋冬用子夏春用苗並搗絞汁服亦曝乾為末小便冲服如覺冷用酒煮服

破經湯 治婦人血氣不行腹臍疼痛

巴豆

七箇

苦苧麝

三錢

皂角

二錢

右為末煉蜜和丸如彈子大每服一九先用麻絲纏部定坐一夜不行再一九如覺寒熱取下赤白水再服一九取行一方不用皂角後四物湯補之

抽刀散 治婦人一切冷氣血

大川烏頭

炮去皮炒黃色一兩

五靈脂

芸薹子

隔紙炒

良薑

各半兩

右為末酒醋各半盞煎至七分溫服

治婦人室女血氣刺痛不可忍日夜叫喚可怜者一服見效

芸薹子

肉桂

良薑

沒藥

各等分

右乾焙為末每服二錢乳香調下熱服不拘時候  
延胡索散 治婦人血氣走作疼痛不可忍及月水不利面色痿黃喫食減少及產後諸疾皆治之

延胡索

三稜

生

當歸

去蘆頭酒浸

莪茂

醋浸微炒等分

右為末每服二錢空心溫酒調下如血氣發盛者及  
月水不調並用童子小便酒紅花同煎調下只三服  
瘥矣或後用黃散子化通珍珠丸一九服之滿月百  
病不生

當歸良薑散 補養血氣去心腹疼痛脇脹滿經絡不  
調或帶赤白腰脚冷痛一切痼病

高良薑

五兩

當歸

桂

去皮各三兩

厚朴

去皮薑製二兩

右乾用紗羅子羅每服二錢水一盞入艾十葉同煎

至七分去滓食前熱服之

小烏沉湯 調中快氣治心腹刺痛

烏藥

一兩  
去皮

甘草

一兩

香附子

砂盆內浙去皮  
毛焙乾攪二兩

右為細末每服一錢鹽湯點不拘時候

金不換散 治婦人血刺痛不可忍者

三稜

莪茂

並細  
剉

巴豆

去皮各  
一兩

右以醎醋一碗熬醋成膏為度先將糠固濟一罐子

陰乾後將藥并醋膏一處置罐子中外用泥裹以平

瓦子一片蓋之用炭火五七片煨常看守却後煙急出即取出看通黑則止不得燒過了便入乳鉢內細研為末有患者炒生薑酒調一錢服之

八僊散 治婦人血氣心腹疼痛立驗

棕櫚

二兩

當歸

一兩

并剉碎

一處燒成炭細研

麝香

一錢

細研

右同研令停每服一錢溫酒調下

三神丸 治室女血氣相搏腹中刺痛引心端經行澀

少或因經事不調以致疼痛

橘皮

二兩

玄胡索

醋煮  
去皮

當歸

去蘆酒浸剉  
微炒各一兩

右為細末酒煮米糊為丸如梧桐子大每服七十九  
加至一百丸空心艾湯下米飲亦得

捉痛散

治婦人血氣痛

玄胡索

一兩

當歸

桂心

各半  
兩

右為末酒調二錢

蠲痛散

治婦人血氣刺痛

荔枝核

燒存性  
半兩

香附子

去毛炒  
一兩



右為細末鹽湯米飲調下二錢不拘時候

治婦人血氣痛遊走及腰痛

蓬朮

切  
乾漆  
研碎各  
二兩

右同炒令漆焦香取出漆不用只用蓬朮為末溫酒調下三錢腰痛胡桃酒下遊走痛冷水調下

治婦人血氣刺痛

用香附子一二斗皆可春令極淨用炒鑊盛米醋者令極久一日夜取出炒乾為末一兩用甘草三錢為

末鹽湯調下亦治血崩不止

治婦人血氣刺痛

神麴 香附子

各炒赤

右等分為末熱酒下

治老婦血氣痛不可忍

老松皮

用醋煮乾

延胡索

右為末秤錘燒紅淬酒調下

土神丸

治婦人血氣不和作痛不止及下血無時月

水不調宜服一名葦撥丸

真蒲黃

炒

葦撥

炒 益鹽

右等分為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九空心溫酒吞下如不能飲米飲下兩服即止

內灸散 治婦人血氣刺痛不可忍者

蓬莪茂

良薑

等分

右為細末熱酒服無時

失笑散 治小腸氣痛及婦人血痛心腹絞痛欲死百

藥不驗者并治急心痛一方失笑膏

五靈脂

炒

蒲黃

炒各等分

右為末每服三錢先用米醋一合熬藥成入水一盞煎一二服溫酒調膏服

又方 治婦人血氣痛

真蚌粉

煨

香附子

末

右等分和勻每服二錢醋調下神效

治婦人血氣攻心腹疼痛不可忍

熟艾

五兩

生薑

四兩

細研

右以布包用水三盞煮令水盡於包中絞取汁一盞  
每服以熱酒調下二合

治婦人不曾生長血氣臟腑疼痛不可忍及治丈夫小  
腸氣撮痛者並宜服二聖丸

乾漆

為末

濕漆

各一兩

右先將濕漆入銚子內熬如一食飯間已來住火與  
乾漆末一處拌和丸如半皂子大每服一丸溫酒吞

下無時元氣小腹膀胱氣痛牙關緊急但搯開牙關  
溫酒化下丸灌下必安怕漆人不可服

又方 治婦人血氣痛

乾薑 赤石脂

右為末醋為丸每服五十丸淡醋湯下立效

治婦人血氣揍痛

用火塘煤一掬細末炒令煙出再用生薑一塊連皮  
搥碎炒至煙起入久窰酒一升同煎一半濾去滓通

口服

石灰散 治婦人氣血痛不可忍者

用取猪貼脊血半盞於湯上煖用杖子攪停後石灰於火上燒令黃為末羅過入灰一錢同血攪停以溫酒服立愈

用黑狗膽一箇半乾半濕割開以篋子排丸如菉豆大蛤粉滾過每服五丸燒生鐵淬酒下其痛即止  
血氣虛損腰腹疼痛

用當歸連中湯加桂南木香若自汗則去木香加人參白朮

醋附丸 治婦人血氣經候不調腹痛面色黃心怔乏力腹脇疼脹頭暈惡心或崩漏帶下便血癥瘕等證室女亦可服凡婦人數數墮胎由血氣不升降或云此藥耗氣殊不知獲效非常古書為婦人仙藥服之百日當顯其效一名醋煮香附丸

用香附子炒去毛以酒醋浸過煮令醋乾焙為細末



以米醋糊丸如梧桐子大每服五十丸醋湯下又方  
為末每服二錢米飲湯調下治冷滯用膠艾葉煎湯  
或加當歸鹿茸附子

又方

用香附子淨一斤入大艾葉四兩當歸二兩如上醋  
浸透者為丸

治婦人久血冷氣攻心疼痛不止

用葉子雄黃二兩細研醋一升煎似稠糊丸如上醋

浸透豆大每服五丸醋湯下無時

治婦人血流血痢心頭疼痛不可忍欲死者及治血崩  
用五倍子為末麪糊為丸每服二三十丸米湯送下  
一方作散冷水調服

坤刀散 治婦人心腹脇肋疼痛不可忍者產前產後  
尤佳

川烏頭 炮去皮臍 牡丹皮 芍藥 乾薑 炮 桂心

沒藥 當歸

各等分

右為細末每服二錢熱酒調下不過三服輕可一服  
效產後加紅花

香甲九 治婦人血海虛冷久積癥瘕癖心腹脹痛胸

膈注悶及月候不調產後蓐勞瘦瘁並宜服之

鼈甲

醋浸一宿 蘇醋炙  
令黃色 秤二兩

京三稜

大者細剉 醋浸  
三日焙乾 二兩

乾漆

搗細炒煙出  
取末秤二兩

沒藥

三分  
別研

木香

肉桂

去粗  
皮

補骨脂

微炒

乾薑

炮

檳榔

細松煙墨

上六味  
各半兩

硃砂

四錢  
別研

右件為細末醋煮麪糊為丸如梧桐子大每服三十丸淡醋湯下不拘時候

治婦人心脾血氣痛不可忍

五靈脂

炒

白薑

炮

右等分為末每服一錢米醋調作膏白湯浸下

治血飲子 治婦人血氣衝心

當歸 菖蒲

右二味等分為細末酒調下一錢

四神散 治血氣腹痛

當歸 芍藥

一兩 乾薑 半兩

每服二錢溫酒調下一服愈一方無乾薑有茱萸等

分治婦人絕妙

玄胡索散 治婦人血暈衝心欲死者

玄胡索

三兩 當歸 二兩

右為末每服三錢用好紅花酒半碗熟調下未服藥丸以硬炭半秤燒紅好醋五升作醋炭薰患人方服

藥

香附子飲 治婦人真心痛

良薑

麻油炒

蒼朮

鹽炒

香附子

石灰炒  
各等分

右為末用燈心煎湯空心服下

分經散 治婦人血氣痛心及遍身手足疼痛及經血不通並皆治之

紅花 蘇木 乳香 沒藥 敗薑 薑黃

當歸 芍藥 川芎 木通 甘草 蓬朮

地黄

生

玄胡索

牡丹皮

凌霄花

右為末每服二錢空心溫酒調下一日三服加血竭  
玳瑁尤佳湘黃蕉明三世業醫用之有效

大烏金散丸

治婦人心腹刺痛身體疼痛惡心產後

惡露不下疼痛不已如經盛行則去白芷延胡索

當歸

熟地黄

白芍藥

川芎

附子

肉桂

沉香

各一兩

延胡索

粉草

香附子

乳香

縮砂

敗薑

白芷

蒲黃

薑黃

檳榔

各半兩

白茯苓

丁香

白朮

各二兩

沒藥

人參

各二錢

右為末醋糊為丸如彈子大百草霜為衣每服一粒  
當歸酒下或嚼薑引下或作梧桐子大則加丸數真  
有奇功

玄胡索散 治婦人血氣攻心痛不可忍并走疰

蓬莪茂

半兩麻油煎  
乘熱切片子

玄胡索

二錢  
半

右細末淡醋湯調下空心

香雅散 治婦人血刺心腹疼痛



當歸 肉桂

各等分

右為末每服二錢水一盞入醋少許煎七分空心熱服

通隔散 治婦人心腹刺痛寒熱往來

蓬朮 延胡索 北芍藥 當歸 川芎 甘草

牡丹皮

右等分細末每服二錢薑酒調服

加減四物湯 治婦人欲念不遂心膈迷悶刺痛

四物湯一貼加橘皮 香附子 延胡索

各半兩

順氣木香丸 治婦人血氣攻刺手足疼痛冷脾心腹

久積搯刺口吐冷涎面目青黃色發歇作時

黃芩花

一兩

巴豆

七箇醋半碗浸一宿於銚內煮盡醋炒令紫色

延胡索

秦艽

桑蛾

各半兩

官桂

一分

木香

一分

石件凡七味為末醋糊為丸如梧桐子大每服六丸  
熱酒下

治婦人心脾疼欲死赤白芍藥枳實當歸加手拈散草

果玄胡索沒藥五靈脂四味甘草同等分薑煎再磨  
沉香木香入服甚效

黑靈散 治婦人遠年血氣刺痛甚者

穿山甲

半箇

黑豆

魚皮

半箇

小兒髮

半兩

皂莢

不蛀者

三挺

右件四味同入甕瓶子內用鹽泥固濟先用文武火  
燒次用大火煨之令赤黃熟放冷取出研細每服半

錢溫酒調下

治血氣逆心煩滿

以燒羚羊角或水牛角末水服方寸匕

治血氣逆心煩悶心痛

用生蒜搗汁服二升則瘥

治血氣逆心煩悶滿心痛

以水牛角燒末酒服方寸匕

治血氣攻心痛不可忍

以蓼根細剉酒浸服之瘥

主血脹腹痛

以蓮房蓮葉酒煮服之

治婦人血氣調中

以牡蠣肉煮食之

血氣小腹疼痛

附論

夫婦人小腹疼痛者此由胞絡之間風有風冷搏於血氣停結小腹因風虛動與血相搏故痛也○小腹疼者衝任脉虛膀胱積冷虛寒與冷氣相勝故小腹痛黃良丸主之在姙娠小腹痛者由肥絡宿冷而姙娠血不行冷

氣血相搏而痛甚者墮胎宜與二氣丸產後臍下苦痛緣惡露不下膀胱有餘血積於氣海也久則變為血瘕黃良丸人參湯主之

方

血竭散 治婦人臍下血積疼痛

血竭 乳香 沒藥 並別研 水蛭 一錢杵碎 白芍藥

當歸 麝香 已上各一錢 虎骨 錢半

右為細末每服三錢空心溫酒調服

乾漆散 治婦人血氣攻小腹疼痛不可忍宜服

乾漆

一兩搗碎炒令煙出

芫花

醋拌炒令乾

木香

檳榔

肉豆蔻

去殼各半兩

當歸

剉微炒

青橘皮

湯浸去白穢焙

桂心

各二分

右為細散不計時候以熱酒調下一錢

牡丹散 治婦人血氣攻膀胱連肚腹疼痛宜服

牡丹

二兩

赤芍藥

當歸

剉微炒

桂心

延胡索

各一兩

沒藥

麒麟竭

芳藟

各半兩

右為細末散每服不計時候熱酒調下一錢

沒藥散 治婦人血氣小腹妨悶疼痛不止宜服

沒藥

一兩

赤芍藥

當歸

剉微炒

紅藍花

芫花

醋拌炒令乾

檳榔

乾漆

搗碎炒令烟出各半兩

右為細散每服不計時候熱酒調下一錢

秘方烏金散

治男子婦人臍腹痛臨卧酒調服之去

臟腑見膿即效忌生冷油膩難化硬物每服三錢兩服後食白粥補之

錦紋大黃

四兩

廣木香

四兩



右去粗皮炭火燒紅黃土內埋取出和木香一處搗為細末

當歸散 治婦人久積血氣疼刺小腹疼痛四肢無力不能飲食

當歸炒 赤芍藥 沒藥 劉寄奴 枳實

延胡索

各等分

右為末熟酒調下一錢無時服

凌霄花散 治婦人久積風冷氣血不調小腹疼刺疼

痛

凌霄花

當歸

剉微炒

桂心

赤芍藥

各半兩

木香

沒藥

各一兩

右為細末散每服不計時候熱酒調下一錢

芫花丸

治婦人氣攻心小腹疼痛及惡血積聚不散

芫花

醋拌炒令乾

桂心

各一兩

硃砂

香墨

釜底墨

各一分

當歸

剉微炒三分

右為末煎醋浸蒸餅和丸如梧桐子大每服於食前

熱酒下十九服之

劉寄奴散 治婦人血氣小腹疼痛宜服

劉寄奴 當歸判桂心 芳藹 牛膝 琥珀已上各一兩

右為細散每服不計時候以熱酒調下一錢

伐鐵散 治婦人臍腹疼痛諸藥不效名曰經痛

川芎 香白芷 當歸各半兩 芫青一錢 乳香

沒藥各半兩同研細

右為細末每服一捻點淡茶清少許摻藥在茶上服

之其痛即止一服進一錢

葳靈散 治婦人久冷氣滯血刺小腹疼痛

葳靈仙

一兩

當歸

沒藥

木香

桂心

各半兩

右為細散無時熱酒調下一錢服忌茶

桃仁承氣湯 治男子女人下焦蓄血小腹急痛內外

有熱大便秘結

大黃

半兩

桂枝

甘草

炙各二錢半

桃仁

浸去皮尖

芒硝

別下各一錢半

右剉細分作三服每煎至臨熟入芒硝半錢再煎沸

溫服以通利為度

治腹常絞痛

甘草

炙

芍藥

各二兩

茯苓

桂心

各三兩

右用水七升煮取二升半分再服之

溫經湯

治婦人小腹痛

茯苓

六兩

土瓜根

芍藥

各三兩

薏仁

二升半

右咬咀以酒三升漬一宿再加水七升煎取二升分

再服

治婦人臍腹疼不省人事只一服立止人不知者云是  
心氣痛誤矣

白芍藥

五靈脂

木通

去皮已上  
各五錢

右為粗末每服四錢醋一盞煎三沸再入水一盞煎  
三沸去滓薑和滓熱服空心溫服

靈寶散 治婦人血氣攻刺痛引兩脇及癖冷氣

丁香 乳香

木香

各一錢半

當歸 延胡索

白芍藥

各半兩

右為末每服一錢空心溫酒調下

治婦人血氣攻刺小腹痛不可忍

當歸

石菖蒲

劉寄奴

已上各一兩

右為細散每服二錢酒一小盞入薑五片同煎至半盞去滓薑熟服

追氣丸 治婦人血氣刺小腹疼痛不可忍一名紫桂丸

芸薹子

微炙

桂心

各一兩

乾薑

半兩

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服五丸無時候  
淡薑湯下常服補血氣破血塊甚有效

定命散 治婦人急血氣室女血臟虛冷月水凝澀攻  
小腹痛一名牡丹散

大黃烏去皮牡丹皮桂心各一兩

右為細末每服一錢酒半盞童子小便半盞煎至七  
分溫服如婦人血癖血氣胎血積聚上衝心腹須臾  
欲絕者用酒一盞生薑一片煎至七分去滓通口服



一用川烏頭炮製去皮臍煉蜜和丸如梧桐子大不計時候熱酒下十九

麒麟竭散 治婦人血氣攻刺小腹痛不可忍

麒麟竭

阿魏

麪煨麪熟為度各一分

桂心

半兩

右為細散每服以熱酒調下一錢

又方

芸薹子

微炒

當歸

剉微炒各一兩

右為細散每服熱酒調下一錢

又方

硃砂

附子

炮製去皮  
臍各一兩

右為末醋煮飯和令熟丸如梧桐子大每服食前以  
熱酒下十九

又方

芫花

醋拌炒  
令乾

竈突煤

各半  
兩

右為末醋煮麪糊和丸如梧桐子大每服不拘時候  
以熱酒下七丸

治婦人臍下痛

黃栢 山梔子

右等分為末空心無灰酒調下五錢

烏金散

甘草

炙 皂角

燒灰存性

右等分為末生地黄同煎七分食前服

猪腎碁子炙 治婦人血積久億冷氣小腹常痛

小麥麴

四兩

高良薑

懷香子

肉蓯蓉

去皮炙為末

蜀椒

各一錢末

豬腎

一對去脂膜切焙萊豆大

右除腎外以水和切作碁子先將腎以水五碗煮次入葱薤白各少許候腎熟以五味調和如常法入藥碁子再煮令熟分三次空腹食之

柴胡丁香湯 治婦人年三十歲臨經豫先腰腹痛甚

則腹中亦痛經縮兩三日

當歸身

一錢

生地黃

二分

柴胡

半錢

羌活

一錢

丁香

四兩

全蝎

一箇

防風

一錢

都作一服水四盞煎至一盞去滓稍熱服食前

坐藥龍鹽膏

丁香

一錢半

金蝎

五箇

木香

一錢半

良薑

一錢

川烏頭

一錢半 炮

枯礬

半錢

龍骨

二錢

茴香

三分

當歸尾

一錢

玄胡索

五錢

紅豆

肉桂

各三錢

炒鹽

二錢

漢防已

酒製一錢

厚朴

三錢

木通

一錢

石為細末煉蜜為丸如彈子大綿裹留絛在外納入

陰戶內

勝陰丹

如上藥力小再合此劑以藥行見効為度

三奈子

川烏頭

大椒

各半錢

柴胡

羌活

各二分

全蝎

蒜

七分

甘松

二分

破故紙

與蒜同煮焙乾八分

麝香

少許

升麻

枯礬

各二分

右為細末煉蜜為丸如彈子大依前用度

又方坐藥迴陽丹

草烏頭

三分

水蛭

三箇炒

蜜蟲

三箇去翅足炒

川烏頭

七分

大蒜

大椒

柴胡

七分

羌活

全蝎

升麻

各一分

甘草

二分

破故紙

一錢

三奈子

華撥

焙半兩

炒黃鹽

一錢必用之藥

枯礬

半錢

右為極細末煉蜜丸如指尖大用綿裹定留絲納陰戶中覺臍下暖為度

玄胡苦楝湯 治臍下冷撮疼痛陰中大寒

肉桂

三分

熟地黃

附子

三分

炙甘草

稍半分

苦楝

二分

黃栢

一分為引用

右都作一服水四大盞煎依常食前

桂香散

治婦人脾血久冷時作腹痛泄瀉

草果

炒去皮

甘草

白朮

良薑

炒香

砂仁

各一兩

淨青皮

炒

訶子肉

各半兩

肉桂

生薑

厚朴

製

棗肉

各一兩

水一碗煮爛令乾同研作餅焙為末每服二錢入鹽少許空心沸湯點服

金耆散

治婦人小腹急痛脹滿

金銀花

黃耆

甘草

地黃

芍藥

當歸

右各等分為末每服五錢重水煎服



又方 治腹中絞痛不可忍

延胡索 當歸 白芍藥 川芎 乾薑

各等分

右為末每服三錢溫酒調下

治小腹疼青黑或赤不能喘

以苦參一兩醋一升半煎八合分二服

血分水分腫滿

附論

夫身腫者有血分有水分之候腎合膀胱為表裏腎主水而膀胱為津液體虛而風濕客於皮膚轉於膀胱津

液壅滯腎水停積蓋脾土虛而不能榮衛故流入于血分也但腫疼退經血自行也血分者經先閉而後腫是血分而為水也經通而腫自消其外候日驗裏如卧蠶頸邊人迎脉動甚也其妊娠體腫者脾胃虛弱肌肉不實則水浸積而為腫腹滿如蠱者水積於胞也如懷胎將產之月脚腫自易產否則難下也產後身腫者亡血太多邪氣乘虛而入故身腫宜與三物湯治之

夫婦人腫滿若先因經水不調後漸至四肢浮腫小便

不通名曰血分水分化為血血不通則化為水矣宜椒  
仁丸先因小便不利後身面浮腫經水不通名曰水分  
宜服葶藶丸方見後血分者經水流通之際寒熱往復  
其血忽為之中止壅塞不可行播在皮膚邪氣相搏經  
血分而為水發為浮腫血分脉經曰經水前斷後病水  
者名為血分積久成水腫難治水分者以水氣上下溢  
於皮膚分散四肢未發為浮腫蓋腎胃之關閉不利故  
聚水而從其類也此病有不同治法亦各異耳

方

椒仁丸 治婦人血分水分腫滿

椒仁 甘遂 續隨子去皮研 附子 郁李仁

黑牽牛 五靈脂研碎 當歸 吳茱萸 延胡索各半兩

芫花醋浸一宿炒黃 石膏各一兩 信砒 膽礬各一分

斑蝥糯米炒黃去米不用 虻青各三十枚去頭足翅糯米炒黃

右為細末麪糊為丸如芫豆大每服一九橘皮湯下  
大黃甘遂湯 治婦人小腹滿如鼓狀小便微難而不

渴產後者此為水與血并結在血室也

大黃

四兩

甘遂

二兩

阿膠

二兩

右以水三升煮取一升頓服之其血當即下

治婦虛能散滯氣風腫水腫

澤瀉

防己

各等分

右為末每服二錢溫酒調下不拘時候

漢防己散 治婦人血分四肢浮腫喘促小便不利

漢防己

當歸

微炒

赤芍藥

桂心

羚羊角屑

青橘皮

湯浸去白穰  
焙各半兩

赤茯苓

大腹皮

剉  
前胡  
去蘆頭

木通

炒各二分

桑根白皮

剉

檳榔

川大黃

剉碎微炒  
各一兩

右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓食前溫

服

枳實散

治婦人血分身體浮腫心腹煩滿

枳實

去穰  
麩炒

當歸

切炒

牛膝

去苗酒  
浸切焙

桑根白皮

剉各一兩

大黃

略炒

牡丹皮

甘草

各半兩

防己

三分  
猪苓

去黑心

人參

青橘皮

去白炒  
各一兩

檳榔

剉

木香

炮各半兩

右為細散每服沸湯點服通口喫日再

大腹散 治婦人血分身體通腫虛煩不食

大腹皮

剉

桑根白皮

剉

檳榔

剉各一兩

當歸

二兩切焙

人參

牡丹皮

甘遂

各半兩

葶藶

一分炒

牛膝

去苗酒浸切焙

赤茯苓

去黑心皮

生乾地黄

焙各一兩

木香

半兩

右為細散每服二錢濃煎紫蘇湯調下日三服

檳榔湯

治婦人血分攻頭面身體浮腫煩熱心悶

檳榔

剉

赤芍藥

人參

百合

各半兩

知母

焙一分

木香

半兩

枳殼

去穰  
麩炒

牛膝

剉

赤茯苓

去黑皮  
各三分

丹皮

郁李仁

去皮  
雙仁

牽牛子

炒各  
半兩

右麤搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服日

二夜一

羚羊角散 治婦人經水先斷後病水名曰血分身體

浮腫煩悶宜服

羚羊角

桂

去粗  
皮

甘草

苦苧蘆

紙上  
炒

木香

郁李仁

炒去皮  
各半兩

青橘皮

去白  
炒

檳榔

剉

當歸

切  
焙



牡丹皮 赤芍藥

各一兩

右為細末每服二錢濃煎桑根白皮湯放溫調下不

拘時候

青橘皮散 治婦人經水纔斷後輒病水四體浮腫

青橘皮

去白炒

大戟

去皮

白茯苓

去黑皮

枳殼

去穰麩炒

當歸

切焙

黃耆

剉各一兩

甘遂

炒

桂

去粗皮各一兩

人參

三分

牛膝

去苗酒浸切焙一兩

右為細散每服二錢濃煎桑根白皮湯調下日再服

赤茯苓散

治婦人血分腹脇膨脹四肢浮腫肩背壅

悶

赤茯苓

三分

川大黃

二兩剉碎微炒

鼈甲

一兩塗醋炙令黃

桂心

半兩

赤芍藥

三分

檳榔

一兩

桑根白皮

三分

枳殼

半兩麩炒微黃去穰

郁李仁

一兩湯浸去皮微炒

牽牛子

三兩微炒

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分同煎至六

分去滓食前溫服

澤漆丸

治婦人血分通身浮腫胸膈不利腹脇脹悶

喘息氣粗不能飲食

澤漆

亭藟

桑根白皮

炙

甘遂

剉炒

令黃

檳榔

剉

牽牛子

各一兩  
生用

昆布

湯洗去鹹  
炙三分

郁李仁

湯浸去皮尖微  
炒黃研一兩

枳實

去穢麤炒  
微黃三分

右除郁李仁搗羅為末入郁李仁再和勻煉蜜為丸  
如梧桐子大每服十丸煎紫蘇湯下食前服溫酒下  
亦得

芍藥湯

治婦人血分頭面浮腫腹脇妨悶四肢煩疼

經絡不通

赤芍藥

一分

桃仁

湯浸去皮尖雙仁  
麩炒微黃別研

枳實

去穢  
麩炒

百合

當歸

劉微  
炒

赤茯苓

去黑  
皮

牽牛子

微  
炒

檳榔

劉各  
一兩

右麤搗篩每服四錢水一盞半入生薑半分切同煎

至八分去滓空心溫服逐日以利為效未利再服

大戟散 治婦人血分心腹脹滿手足浮腫肩背疼痛

大戟

當歸

劉微  
炒各三分

芫花

半兩醋拌  
炒令乾

猪苓

三分去  
黑皮

青橘皮

三分湯浸  
去白穢焙

川大黃

半兩劉  
碎微炒

赤芍藥

一分

桃仁

三分湯浸去皮尖炒微黃

右為細末每服一錢食前溫酒調下

郁李仁散 治婦人血分氣血壅澀腹脇脹悶四肢浮

腫坐臥氣促

郁李仁

一兩湯浸去皮炒令微黃

桂心

半兩檳榔三分

牽牛子

一兩微炒

木香

半兩青橘皮

半兩湯浸去白穰焙

右為細散每服一錢食前溫酒調下

芫花丸 治婦人血分四肢浮腫心腹氣滯不思飲食

芫花 大戟 甘遂 川大黃

各一兩

青橘皮

一兩半湯浸去白穰

右細剉以米醋一中盞同藥入於銚子內慢火炒令醋盡搗為細末麪糊和丸如梧桐子大每服七丸溫酒調下食前

治經脉不利即為水水流走四肢悉皆腫滿名曰血分其候與水相類醫作水治之非也宜此方養生必用方仁存名當歸丸

人參 當歸

大黃

濕紙裏三兩同飯  
蒸米熟去紙切焙

瞿麥穗

桂心 赤芍藥

白茯苓

各三兩

葶藶

炒黃研一分

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心米飲下十五丸至

二十九

鼈甲丸 治婦人水分肢體腫滿不消因經水不通宜

先去水後調經血

鼈甲

去裙襴醋炙

杏仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒

苦葫蘆

用穰

天門冬

去心焙各一兩半

巴豆

一分去皮心膜出油盡

石菖蒲

微炒

猪苓

皂莢

醋炒

桂

去粗皮

葶藶

隔紙炒

甘遂

微煨

苦參

大黃

剉碎醋炒

芫胡

去苗

當歸

切焙

羚羊角

鑊各一兩

龍骨

燒三分

右為末煉蜜和丸如小豆大每服十丸至十五丸食

前溫水下日三服如一二服內水通利即減丸數及

間日服

黃耆散

治婦人水分偏身浮腫煩悶喘渴經水不調

黃耆

剉

赤茯苓

木香

各一兩

草豆蔻

去皮

桂

去粗皮

當歸

切

防風

去叉

紫葳根

炙剉凌霄花根是也

桑根白皮



甘草

炙

續斷

澤瀉

各三分

甘遂

半兩

右為末每服三錢水一盞半入小豆半匙生薑一塊

搗碎煎至七分去滓溫服空心日午臨卧各一服

葶藶丸 治婦人水分浮腫不退經脉不利

葶藶

隔紙炒二兩

木香

陳橘皮

湯浸去白焙

枳殼

去穢炒

楮根白皮

炙

乾薑

炮

檳榔

煨

防已

朴硝

剉

馬兜零

去皮

蓬莪茂

煨炒各三分

甘遂

微煨一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每日空心日午夜卧

時用桑根白皮煎湯下三十丸至四十丸以利爲度  
如利即減丸數

防已飲 治婦人水病浮腫因經水斷絕名曰水分

防已

一兩

葶藶

隔紙炒

赤茯苓

去黑皮各半兩

陳皮

湯浸去白焙

玄參 黃芩

去黑心

澤漆

炒各一兩

猪苓

去黑皮

白朮

剉

杏仁

湯浸去皮尖雙仁不用炒

大豆

炒各一兩半

桑根白皮

剉二兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓空心日

午臨卧各一服

赤茯苓丸

治婦人水氣在皮膚浮腫水不通

赤茯苓

去黑皮 一兩

猪苓

去黑皮 一兩半

瀉澤

一兩半

小海蛤

陳橘皮

湯浸去白炒

桂

去粗皮 三分

防已

澤瀉

微炒各 一兩

木通

炙剉 一分

赤芍藥

一兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九丸煎桑根

白皮湯下日三

大腹皮丸

治婦人月水腫滿不消經水斷絕

連皮大腹

一兩半

防已

澤瀉

木香

蓬莪茂

煨剉

枳殼

去穰麩炒  
各一兩

檳榔

煨

陳橘皮

湯浸去  
白炒

牽牛子

微炒各  
三分

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每日空心日午夜卧生薑湯下三十九至四十九如減即少服

猪苓散

治婦人水病腫滿小便滯澀經水斷絕

猪苓

去黑皮

防己

各一兩

桑根白皮

炙

郁李仁

湯浸去  
皮炒

百合

瞿麥穗

各三分

甘遂

兩

右為末每服三錢水一盞煎至七分空心日午温服

水通即止去滓早食前夜卧一服如踈利即減服

芍藥湯 治婦人水分面目身體浮腫胸滿短氣小便

不利

赤芍藥

剉炒

桑根白皮

剉炒

木通

各一兩

百合

三分

甘遂

兩半

大腹皮

碎五枚

郁李仁

湯浸去皮

炒三分

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分空心日午臨

卧服水通即止

木通飲 治婦人水分先病水腫日久不消致經水斷

絕

木通

對一兩

桑根白皮

剉

澤瀉

防己

赤茯苓

去黑皮

石韋

去毛各三分

大根

右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服

日二如水通利即踈服

甘遂丸 治婦人水分四肢浮腫經水斷絕

甘遂

微炒一分

葶藶

隔紙炒二兩

黃連

去鬚

天門冬

去心焙各一兩半

苦葶藶

一枚取攘

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服十九至十五丸  
空心溫酒下水利即踈服

葶藶丸 治水分

葶藶

炒別研

續隨子

去殼研各半兩

乾笋末

右為末棗肉丸如梧桐子大每服七丸煎扁竹湯下  
大便利者減續隨子葶藶各一分加白朮半兩

大戟散 治婦人水氣四肢浮腫心胸痞滿痰毒壅滯  
喘息稍急小便不利坐卧不安

大戟

前胡

去蘆頭

木通

檳榔

赤茯苓

各一兩

當歸

桑根白皮

剉

防已

各半兩

陳橘皮

湯浸去白穢焙

紫蘇莖葉

各三分

右為細散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓空心服以利為效未利再服

漢防已散 治婦人頭面及四肢浮腫心胸滿悶喘促

小便赤色

漢防已

三分

赤茯苓

一兩

桑根白皮

剉

檳榔

木通



川大黃

剉碎  
微炒

紫蘇莖葉

各一兩

枳殼

三分  
麩炒  
微黃去穢

甘草

半兩炙  
微赤剉

右為散每服四錢水一盞入生薑半分葱七寸煎至六分去滓溫服不拘時候

赤茯苓散 治婦人水氣身體浮腫喘息微促小便不利

赤茯苓

漢防己

猪苓

去黑皮

澤漆

木通

剉

檳榔

各一兩

桑根白皮

剉

右為散每服四錢水一盞入生薑半分煎至六分去滓每於食前溫服為效

牽牛子散 治婦人水氣腹脇妨悶四肢浮腫喘息微促小便不利

牽牛子

二兩 微炒

青橘皮

湯浸去白穰焙

檳榔

各一兩

漢防已

赤茯苓

各半兩

木通

剉

桑根白皮

剉各三分

右為細散每服三錢煎生薑葱白湯調下空心服以利為效未利再服

商陸鱧魚湯 治婦人水病頭面及四肢浮腫喘急小

便不利宜服

商陸

剉

木通

剉

陳橘皮

湯浸去白穢  
焙各一兩

赤小豆

半升

鱧魚

二枚重一斤

桑根白皮

剉二兩

右為末用水五升入生薑一兩葱五莖同煮令豆熟

為度每服喫一中盞魚豆任意食之不拘時候

治婦人水氣偏身浮腫喘急

麝香

一錢細研

雄黃

二錢細研

芫花

半兩醋拌炒令乾

甘遂

半兩煨令黃

右為散都研令勻每服半錢空心以溫酒調下以快利為度未利再服

治婦人水氣腹脹四肢腫滿喘息微促小便不利

青橘皮

三分湯浸  
去白穰焙

甘遂

煨令  
微黃

郁李仁

湯浸去皮研  
入各半兩

右為散每服半錢空心溫酒調下至午時當利即再服以大利為效

麝香散

治婦人短氣虛羸徧身浮腫皮膚急

麝香

三銖

雄黃

六銖

芫花

甘遂

各二分

右治下篩酒服五錢匕老小以意增減亦可為丸如  
小豆大酒服七丸一方小品無雄黃深師以蜜丸如  
大豆服二九日三治三焦決滿水在胸外名曰水病  
腹濁大在腹表用大麝香丸華陀一方有人參二分  
為丸服

人參白朮飲

人參 白朮

炒

草果

去皮

厚朴

薑製

川薑

炮

半夏麴

大腹子

炮各一兩


甘草

炙一兩

澤蘭

或加半兩

右為粗末每服四錢水一盞生薑二十片棗一箇同煎至八分去滓食前服



普濟方卷三百三十五